

香港政府新聞處

新聞公報

一九七二年八月二十日

星期日

麻疹的病徵與預防

兒童祇須注射預防麻疹疫苗就可免除被傳染的危險。

醫學的發明，開始把一種傳統觀念打破了，古老的人說一個人一生必會出麻疹一次，現已證明是不確的。不幸的是，香港还有不少迷信這錯誤觀念。

麻疹像天花症一樣，是由傳染而來，亦跟天花一樣可以用疫苗加以預防。

目前，醫務衛生處推行中的預防麻疹運動，旨在使家長對麻疹症有更深刻的認識，為其仍未接受過麻疹注射的幼齡子女接受預防注射。

麻疹是一種毒菌，這種毒菌會在患者的口腔及鼻液中繁殖起來，由呼吸、咳嗽、噴嚏傳播空間，因此很容易會傳染他人。此外，接觸患者用過的物品，也會被傳染。

麻疹的病徵是這樣：

當一個人感染麻疹病菌之後，大約經過十天至十四天，最長二十一天的潛伏期間便發高熱，傷風、怕光、咳嗽聲音燥啞、口腔有黏膜，再過數天面部出現紅疹，繼而胸背等部亦出紅疹。有時患者會眼紅、有咳、喉部有白膜。

這種疾病原非極其嚴重，其所以被認為嚴重者，因其可能引起併發証如眼膜發炎嚴重者會引致失明，支氣管炎、肺炎、腸胃炎、中耳炎或甚至腦炎（本港患麻疹病而致命之兒童，以患肺炎併發症者為多）。

兒童染上麻疹後，即須及早延醫治療。

但預防是勝於治療，故注射預防麻疹疫苗是最佳辦法。

年齡在九個月至五歲而未染過麻疹的兒童，都應接受注射，以免受麻疹侵襲。

兒童在上述年齡接受注射，原因是初生嬰兒通常都會由母體得到一些對此種疾病的免疫能力，但這種天然免疫能力約在一年後就消失，因此在嬰兒長大到九個月來施以注射是最適合的。

本港現採用的麻疹預防疫苗十分安全，並無不良反應，故家長大可安心。

現在全港的政府母嬰健康院、政府診所、及公立醫院等都有此種注射服務，同時政府派出流動注射隊到新區及廉租屋邨為兒童免費注射。

工業意外可以避免

當向僱工業界注意安全

香港每年因發生工業意外而遭受的損失十分龐大，而情況且日趨嚴重。工業界對安全問題漠不關心，實為主要原因。

據統計顯示，在一九七〇年勞工處接獲的意外報告凡二四六一〇宗，較一九六九年增加達一倍，一九七〇年因意外所損失的工作日為四二八、一五六日，較諸同期因勞資糾紛而損失的工作日多三十七萬日或八倍。

勞工意外賠償金，於一九七〇年內達一千零五十餘萬元，其他金錢或生產上的損失，亦甚為巨大，包括因意外而導致材料及製成品的毀壞，受傷工人停工期內生產力的損失，訓練新工人以代替受意外工人崗位的金錢和時間。其他工人因意外而間接遭受的影響，凡此種種，都是難以估計的，但可以肯定較諸現金賠償必多出數倍。這實為香港工業的一大損失，也是工業發展的一大障礙。

勞工處工業安全訓練主任賈達祿，工業意外的成因十分複雜，但大致可歸納為兩大類：工人的大意隨便及工業安全設備不足，二者之中，以第一類較為容易糾正和控制。

工人的大意和隨便，除了因為個人的不小心和一時疏忽而做或外，他們的情緒，亦是一個重要的因素，但是較難於控制的。

安全的工作環境是工業安全的基本原則，這是人為的因素。同時，影響所及，不但是個人，亦是整個工廠的問題。

工業意外，大都可以防範的，預防的方法概括可分下列各點：

*完善的管理：這包括設計、操縱、指揮和控制四方面。

*強制施安全規例，使工人在工作時，必須作安全的措施，戴上適當的眼罩、頭盔、穿上安全的工作衣服、使用安全的工具。

*經常檢查機器及工作的環境及調查工人的工作情緒。

*給予工人適當的安全知識，否則縱然有優良的技巧，而不顧安全，技巧亦不會使用長久。

總而言之，意外的預防，需要僱主、監督及工人的衷誠合作，一方面的疏忽，已足以造成工業的意外。

勞工處一向對工業安全十分重視，並且極力鼓吹工業界人士對該問題的注意。

在這方面的工作，包括工業安全訓練中心的設立，督察的巡視，及工業安全的宣傳。

工業安全訓練中心，始設於一九六七年，至七一年底止，舉辦了一一四個訓練講習班，訓練學生工人達五、八、四、三人，雖然成績已不錯，事實上，工廠的响应仍未够热烈。例如，在一九七一年十月，該中心發出一千五百封通告予各廠商，請派員接受免費訓練，但只得五十一位廠商回覆，反映大部份工業界人士對該問題的仍不关心。

勞工處又經常派遣督察到各廠調查工人工作情形及其安全設施；並給予他們適當的指導。

至於工業安全的廣泛宣傳，是針對社會及工業界各階層人士而舉办的，去年，該中心即行八種不同的工業安全標貼，發予逾二萬間的工廠，並舉辦了多次的工業安全展覽會，藉以灌輸市民工業安全知識，使他們時常警惕。

安全訓練主任賈達指出：勞工處工業安全的各項措施，只是導致工業安全的工具，安全能否獲致在乎工業界人士對這問題的注意和是否善用這些工具。

勞工處經常歡迎工業界人士查詢各項有關工業安全問題及參加訓練班，以求減少意外的發生。